BELENUS® 30 WG

INSECTICIDA
GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.864

BELENUS® 30 WG es un insecticida que actúa por contacto, recomendado para el control de las plagas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Indoxacarb (*)	30% p/p (300 g/kg)
Coformulantes c.s.p.	100% p/p (1 kg)

(*) (*S*)-*N*-[7-cloro-2,3,4a,5-tetrahidro-4a-(metoxicarbonil)indeno-[1,2-*e*][1,3,4]oxadiazin-2-ilcarbonil]-4'-(trifluorometoxi) carbanilato de metilo

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:

anasac

ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

Fabricante: Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Lote:.
Fecha Elab:
Fecha Venc:

Contenido neto: 510 g

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B. LAMPA – CHILE
ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.
Town South Donghua District, Longyou County, ZHEJIANG, CHINA. ZIP: 324400
NANTONG SHIZHUANG CHEMICAL CO., LTD.
N° 22, Second Huanghai Road, Chemical Industry Park,
Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu, China

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

BELENUS® 30 WG, es un insecticida, cuyo ingrediente activo Indoxacarb pertenece al grupo químico de las Oxadiazinas. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del granulado dispersable usar delantal impermeable, antiparras, guantes impermeables, máscara con filtro y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<< DEBE DAR AVISO A LOS APICULTORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA APLICACIÓN >>

<< APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MAÑANA O AL ATARDECER >>

BELENUS® 30 WG, es prácticamente no tóxico para aves, moderadamente toxico para microcrustáceos acuáticos y peces, altamente tóxico para algas y **MUY TÓXICO PARA ABEJAS**.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

<< LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: No se dispone de antídotos específicos. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático. **Síntomas de Intoxicación:** Irritación y secreción ocular, irritación gástrica, diarrea, obstrucción intestinal y hemólisis.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. **En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **En todos los casos**, traslade al paciente al hospital más cercano, en lo posible lleve un envase o la etiqueta del producto.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **BELENUS® 30 WG**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.

v20250222

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

Belenus® 30 WG es un insecticida que actúa por contacto, recomendado para el control de lepidópteros en frutales de carozo, pomáceas, vides, arándanos, avellano europeo, tomates, papas, brásicas y maíces.

Instrucciones de Uso:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Manzanos, Perales, Durazneros Nectarines, Ciruelos, Cerezos, Guindos, Nogales	*Cydia pomonella* *Grapholita molesta* *Edwardsiana crataegi* *Naupactus xanthographus*	17 g/hL	Realizar estas aplicaciones para polilla cuando el modelo de días grado y las capturas de trampas de feromonas indiquen los niveles de población adecuados para aplicar. Para Burritos, aplicar apenas aparezcan los primeros ejemplares adultos en el follaje.	Manzana, Pera, Nuez: 7 Carozos: 1
Uva de Mesa, Uva Vinífera	*Proeulia auraria* *Naupactus xanthographus*	17 g/hL	El insecto deja de alimentarse y por lo tanto no causa daños a las pocas horas de aplicado el producto.	5
Arándanos	*Proeulia* spp	17 g/hL	Aplicar al detectar los primeros ejemplares larvarios, cuando los umbrales económicos de la plaga así lo indiquen.	3
Avellano europeo	Cabrito de la frambuesa *Aegorhinus superciliosus*)	17 g/hL (Dosis mínima 170 g/ha)	Aplicar al observar los primeros ejemplares adultos.	55
Tomates	*Tuta absoluta* Gusanos Cortadores (*Agrotis* spp, *Helicoverpa zea,* *Pseudaletia* spp, *Peridroma* spp)	200 g/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares de adultos en trampas y de larvas, cuando los umbrales económicos de la plaga así lo indiquen. Repetir cada 7 a 10 días.	3
Papa	*Phthorimaea operculella* (Polilla de la papa)	250 g/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares. Se podrá repetir a los 7 a 10 días.	1
Repollo, Repollo de Bruselas, Coliflor, Brócoli	*Plutella xylostella*	200 g/ha	Aplicar al observar los primeros ejemplares. Se puede repetir la aplicación a los 8 a 10 días	7
Maíces dulces y chocleros	*Helicoverpa zea*	200 g/ha	Aplicar con 5% de emisión de pistilos. Repetir cada 7 días	30

Instrucciones de uso:

- En avellano aplicar máximo 1 vez por temporada. Para el resto de los cultivos realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada.
- Intervalo de aplicación: Frutales 18 días; Brásicas 8 a 10 días; Papa y Tomate 7 a 10 días; Maíz 7 días.
- Se recomienda agregar un surfactante para aplicaciones en Brásicas y Maíces.
- Volúmenes de agua sugeridos: Pomáceas, Carozos y Nogales: 1.500 a 2.000 L/ha; Vides: 800 a 2.000 L/ha; Arándanos: 400 a 1.000 L/ha; Avellano europeo: 1.000 L/ha; Tomate: 400 a 1.000 L/ha; Brásicas, Papa y Maíz: 200 a 400 L/ha.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hr.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura (< 28 °C) y viento, temprano en la mañana o al atardecer. No aplicar durante las horas de más calor (sobre 28 °C).
- Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje.
- No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **Belenus® 30 WG** y luego completar con agua hasta el volumen final requerido, manteniendo agitación constante.

Preparar y aplicar siempre con el agitador funcionando.

Compatibilidad: Belenus® 30 WG es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: Belenus® 30 WG es incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado, para personas y animales.