



## INSTRUCCIONES DE USO

**PUNTO® 35 SC**, insecticida sistémico especialmente indicado para el control de los insectos descritos en el cuadro de instrucciones de uso

### Cuadro de Instrucciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Vid	Chanchito blanco ( <i>Pseudococcus viburni</i> ; <i>P. rubigena</i> , <i>P. cribata</i> , <i>P. longispinus</i> .)	1.2 – 2.5 L/ha (2 cc/planta)	Aplicación vía riego tecnificado: Distribuir la dosis en función de la densidad de plantación y número de goteros. Realizar monitoreo de la plaga y aplicar al detectar los primeros movimientos de ninfas, temprano en la temporada, con brotes de 15 – 45 cm. Utilizar dosis alta con historial de fuerte presión de la plaga o de alta infestación. Las raíces absorbentes deben estar en plena actividad y debe existir una adecuada condición de humedad en el suelo para lograr una óptima absorción por parte de la planta. Aplicar en el transcurso de un riego habitual, aproximadamente en el tercio medio del total de riego. Agitar constantemente la mezcla mientras se inyecta al sistema.	15
		50 – 60 cc/100 L de agua	Aplicación foliar: inmediatamente post-cuaja. Realizar monitoreo para detectar movimiento de ninfas. No debe distanciarse más allá de 45 días de la aplicación al riego. Efectuar 2 aplicaciones separadas cada 15 días si no hubo aplicación al riego.	
Vid, Duraznero, Nectarino	Pulgón de la uva ( <i>Aphis illinoensis</i> ) Pulgón verde del duraznero ( <i>Myzus persicae</i> ) Pulgón negro del duraznero ( <i>Brachicaudus persicae</i> )	20 – 30 cc/100 L de agua	Aplicar al follaje hasta antes de floración.	Vid, Nectarin 15 Duraznero 20
Manzano	Chanchito blanco ( <i>Pseudococcus viburni</i> y <i>Pseudococcus calceolariae</i> )	60 g/hL	Aplicar según monitoreo de la plaga, al observar los primeros ejemplares con un volumen de agua que permita un buen cubrimiento.	21
Tomate de invernadero	Mosquita blanca ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	Riego por goteo o cinta: 0,03-0,04 cc/planta	En almácigos regar con una solución de 0.5 L de agua. También aplicar en el hoyo de la plantación al momento del trasplante.	3
		0.8-1.2 L/ha	Aplicación al riego: La dosificación por hectárea está dada para plantaciones con densidades de 28 a 34.000 plantas de tomate. En almácigos regar con una solución de 0.5 L de agua. También aplicar en el hoyo de la plantación al momento del trasplante.	
		40-60 cc/100L agua.	Aplicación al follaje: Aplicación foliar temprana, al aparecer los primeros individuos.	
Limonero	Mosquita blanca de los citrus, mosquita blanca algodonosa.	40 – 60 cc/100 L de agua.	Aplicación foliar al aparecer la plaga, mojando abundantemente y con alta presión.	21

### Instrucciones de uso:

- No aplicar ante la posibilidad de lluvias, o después de lluvias recientes o en condiciones de alta humedad en el medio de desarrollo de la planta.
- Aplicación manual mediante monitoreo de la plaga, al observar movimiento de los primeros insectos.
- Realizar como máximo 1 vez por temporada en tomate y manzano, para el resto de los cultivos aplicar un máximo de 3 aplicaciones por temporada, con intervalo de 20 días.
- Aplicación al suelo vía riego tecnificado al detectar los primeros movimientos de insectos sobre las plantas. Aplicar una vez en la temporada. Aplicar con raíces en plena actividad para asegurar la absorción del producto. Inyectar el producto en el equipo de riego en el tercio medio del tiempo total de riego.
- Mojamientos recomendados durazno, nectarin 1000 a 1500 L/ha. Vides y manzana 1500 a 2000 L/ha. Limón 2000 a 3000 L/ha. Tomate 400 a 800 L/ha.
- Aplicar dosis menor con baja presión de la plaga y dosis mayor con presiones media a altas.

**Preparación de la mezcla:** Llenar el equipo pulverizador hasta la mitad con agua, manteniendo el agitador en marcha. Agregar **PUNTO® 35 SC** en la dosis requerida, luego completar el volumen de agua según la capacidad, manteniendo agitación constante, para lograr una solución homogénea.

**Compatibilidad:** **Punto® 35 SC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

**Incompatibilidad:** **Punto® 35 SC** es incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados, si se siguen las instrucciones de uso.

**Tiempo de reingreso:** 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



**NOCIVO**

