

INSTRUCCIONES DE USO

KONAN® 240 SC es un acaricida que actúa por contacto, controlando todos los estados de desarrollo de los ácaros. El modo de acción es la inhibición de la síntesis de lípidos, por esto el producto no presenta riesgo de resistencia cruzada con otros acaricidas. **KONAN® 240 SC** no tiene un efecto negativo sobre las poblaciones de insectos predadores de arañitas (*Phytoseidos*), lo que lo hace ser una muy buena alternativa dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas.

Cuadro de instrucciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis (cc/hL)	Observaciones	Carencia (días)
Vides de mesa, para vino y para pisco	Falsa arañita roja de la vid, Arañita roja de la vid			21
Manzanos, Perales, Durazneros, Nectarinos, Ciruelos, Cerezos, Nogales, Almendros, Almendros, Damascos, Naranjos, Clementinos, Mandarinas, Limoneros	Arañita roja europea, Arañita bimaculada, Arañita roja de los cítricos, Falsa arañita roja de la vid, Arañita parda de los frutales	50 - 60	Aplicar a inicios de las infestaciones de la plaga, temprano o tarde en la temporada, antes que las poblaciones de ácaros sobrepasen los umbrales de daño económico, especialmente si se observa una baja población de insectos benéficos. Aplicar con volúmenes de agua que permitan una adecuada cobertura del cultivo.	Cerezas, nueces, limones: 7 Manzanas, peras, almendras, ciruelas, nectarines, duraznos y damascos: 14 Naranjas: 15 Clementinas, mandarinas: 20



CUIDADO



Instrucciones de uso:

-Volúmenes de agua sugeridos:

Vides en espaldera: 500 a 1.000 L de agua/ha. Vides en parronales: 1.200 a 1.500 L de agua/ha.

Durazneros, nectarines, damascos, ciruelos, manzanos y perales: 1.500 a 2.000 L de agua/ha. Cerezas: 1.500 L de agua/ha.

Cítricos: 2.000 a 3.000 L de agua/ha. Almendros: 2.500 L de agua/ha. Nogales: 1.500 a 2.500 L de agua/ha.

En caso de ser necesario para lograr una buena cobertura del huerto a tratar, se recomienda aumentar los volúmenes de agua, manteniendo la concentración de **KONAN® 240 SC**

-Se recomienda realizar solo una aplicación por temporada.

-Usar dosis menor con baja presión de la plaga a controlar y dosis mayor con presiones medias a altas.

-Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hr.

-Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer. No aplicar durante las horas de más calor (sobre 28 °C).

-Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje.

-No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **KONAN® 240 SC** y luego completar con agua hasta el volumen final requerido, manteniendo agitación constante. Preparar y aplicar siempre con el agitador funcionando.

Compatibilidad: Es compatible con productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección personal. No corresponde indicar reingreso de animales ya que los cultivos en los que se recomienda no tienen como objetivo la alimentación animal.



CUIDADO

