

MOXAN MZ WP

FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.513

MOXAN MZ WP, es un fungicida con acción sistémica y de contacto, para uso en forma preventiva y curativa. Para el control de las enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Mancozeb (*)	64% p/p (640 g/kg)
Cimoxanilo (**)	8% p/p (80 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100% p/p (1 kg)
(*) Complejo (polímerico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cítrica	
(**) 1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetyl]-3-etylurea	

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Importado y Distribuido por:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA - CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China



New Tech Agro
Fundo San José del Boldal S/N
Quinahue, Santa Cruz, Chile

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

MOXAN MZ WP, fungicida, cuyo ingrediente activo Mancozeb pertenece al grupo químico de los alquilenbis (ditiocarbamatos) y Cimoxanilo pertenece al grupo químico de las oximas de cianoacetamidas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Despues de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

MOXAN MZ WP, es prácticamente no tóxico a aves y microcrustáceos acuáticos. Moderadamente tóxico a peces. **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<< LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **En caso de contacto ocular:** lavar los ojos con abundante agua fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo. **En caso de ingestión:** administrar agua (1 taza) y NO provocar vómito. **En todos los casos** trasladar al afectado al centro hospitalario más cercano.

Síntomas: irritación cutánea y ocular. Irritación del sistema gastrointestinal, náusea, vómitos, dolor de cabeza.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **MOXAN MZ WP**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustraiga de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

MOXAN MZ WP, es un fungicida con acción sistémica y de contacto, para uso en forma preventiva y curativa.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES	CARENZA (días)
TOMATE	Tizón tardío, Cancro del tallo, Tizón temprano, Alternariosis	1,5-2,0	Aplicar con condiciones predisponentes a las enfermedades, después del transplante y con plantas arraigadas. Al mantenerse las condiciones se puede repetir cada 7-10 días. Realizar un máximo de 3 aplicaciones en la temporada, dentro de un programa que incluya productos de diferente modo de acción. Volumen de agua 400 a 1000 L/ha dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, logrando un adecuado cubrimiento del follaje.	10
PAPA	Tizón tardío, Tizón temprano	1,5-2,0	Aplicar con condiciones predisponentes y una vez las plantas arraigadas de unos 10 cm de altura. Repetir cada 7-10 días si persisten las condiciones favorables. Realizar un máximo de 3 aplicaciones en la temporada, dentro de un programa que incluya productos de diferente modo de acción. Volumen de agua sugerido: de 200 a 600 L/ha dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, logrando un adecuado cubrimiento del follaje.	8
TABACO	Mildiú, Mancha anillada, Pié negro,	1,5-2,0	Aplicar con plantas arraigadas después del transplante. Se puede repetir a los 5-7 días. Realizar un máximo de 3 aplicaciones en la temporada, alternando con productos de diferente modo de acción. Volumen de agua sugerido: 200 a 500 L/ha dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, logrando un adecuado cubrimiento del follaje.	N.C
AJO, CEBOLLA	Mildiú	1,5-2,0	Aplicar con condiciones favorables a la enfermedad. Se puede repetir si persisten las condiciones, cada 7-10 días. Realizar un máximo de 3 aplicaciones en la temporada, alternando con productos de diferente modo de acción. Volumen de agua sugerido: 400 L/ha, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, logrando un adecuado cubrimiento del follaje.	8
SANDIA, MELON, ZAPALLO, PEPINO DE ENSALADA	Mancha foliar, Picada del fruto	1,5-2,0	Aplicar al existir condiciones predisponentes a la enfermedad y repetir cada 7 a 10 días, si persisten las condiciones. Realizar un máximo de 3 aplicaciones en la temporada. Volumen de agua sugerido: 200 a 400 L/ha dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, logrando un adecuado cubrimiento del follaje.	8
ARVEJA	Mildiú	1,5 a 2	Iniciar las aplicaciones en tercer nudo y repetir a los 7 a 10 días mientras se mantengan las condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de 1 aplicación. Volumen de agua sugerido: 400 a 600 L/ha, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, logrando un adecuado cubrimiento del follaje.	30
LECHUGA	Mildiú o Bremia	2 kg/ha	Aplicar preventivamente al presentarse condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, repetir cada 7 días mientras se mantengan las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar un máximo de 3 aplicaciones en la temporada, alternando con productos de diferente modo de acción. Volumen de agua sugerido: 200 a 400 L/ha dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, logrando un adecuado cubrimiento del follaje.	30

Instrucciones de uso: Utilizar las dosis menores cuando el cultivo presente un menor desarrollo vegetativo y las dosis mayores cuando el cultivo presente su desarrollo vegetativo completo.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua a utilizar, agregar la dosis requerida de **MOXAN MZ WP**. Luego llenar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo siempre agitación constante. Si se aplica con un coadyuvante, agregar este al final, previamente disuelto en agua.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad: No presenta efectos fitotóxicos, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 24 horas para reingresar al sector tratado para personas y animales.



CUIDADO

