




Poly-Zn[®]



Fertilización
Foliar

Contenido neto

10
LITROS

Poly-Zn®

Número de Lote: ver envase.
Fecha de fabricación: ver envase.
Fecha de vencimiento: ver envase.

Fertilizante Inorgánico a Base de Micronutrientes	Composición: Zinc (Zn).....15% m/v
Fabricante  anasac ANASAC CHILE S.A. Almirante Pastene 300. Providencia, Santiago de Chile. www.anasac.cl CONTENIDO: 10 LITROS	Palabra de advertencia: PELIGRO Pictogramas:   

Indicaciones de peligro:

H290: Puede ser corrosiva para los metales. H302: Nocivo en caso de ingestión. H315: Provoca irritación cutánea. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a la mano. P102: Mantener alejado del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes de utilizar. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P264: Lavar exhaustivamente manos y rostros después del manejo del producto. P270: No comer, beber o fumar mientras se utiliza el producto. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. P301 + P312 + P330: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. Enjuagarse la boca. P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua abundante. P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P362 + P364: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar. P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. P391: Recoger el vertido. P405: Guardar bajo llave. P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión o en un recipiente con revestimiento interior resistente. P501: Disponer de los contenedores de acuerdo a la regulación nacional.

Palabra de advertencia: **PELIGRO**

Pictogramas:



Indicaciones de peligro:

H290: Puede ser corrosiva para los metales. H302: Nocivo en caso de ingestión. H315: Provoca irritación cutánea. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a la mano. P102: Mantener alejado del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes de utilizar. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P264: Lavar exhaustivamente manos y rostros después del manejo del producto. P270: No comer, beber o fumar mientras se utiliza el producto. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. P301 + P312 + P330: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. Enjuagarse la boca. P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua abundante. P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P362 + P364: Quitar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar. P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. P391: Recoger el vertido. P405: Guardar bajo llave. P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión o en un recipiente con revestimiento interior resistente. P501: Disponer de los contenedores de acuerdo a la regulación nacional.

Poly-Zn®

Número de Lote: ver envase.

Fecha de fabricación: ver envase.

Fecha de vencimiento: ver envase.

Fertilizante Inorgánico a Base de Micronutrientes

Composición:	
Zinc (Zn).....	15% m/v

Contaminantes	
Cadmio: 4 ppm	Mercurio: 1 ppm
Arsénico: 30 ppm	Plomo: 30 ppm
Níquel: 30 ppm	Cromo (VI): 2 ppm
Cobre: 30 ppm	

Parámetros Físicoquímicos
Fertilizante inorgánico líquido en solución.
Solubilidad: 100% a 20°C.
Densidad: 1,36 g/ml a 20°C.
pH (al 10%): 1,5 a 20°C.

Fabricante



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300.

Providencia, Santiago de Chile.

www.anasac.cl

CONTENIDO: 10 LITROS

CARACTERÍSTICAS: POLY Zn es un fertilizante foliar líquido, altamente compatible con otros fertilizantes y productos fitosanitarios, formulado a partir de una fuente de Zinc de alta solubilidad, higroscopicidad y delicuescencia, lo que permite una elevada eficiencia de penetración foliar, incluso en condiciones de baja humedad relativa. Los coformulantes de POLY Zn, principalmente Ácidos Tricarboxílicos y Políoles, otorgan a POLY Zn una alta capacidad de humectación del follaje tratado, características que aseguran un alto porcentaje de absorción y translocación del nutriente aplicado. Todo lo anterior convierte POLY Zn en una herramienta para aumentar, de manera efectiva, los contenidos de Zinc en hojas, corrigiendo así las deficiencias foliares del elemento y/o mejorando el crecimiento vegetativo.

“Corrige deficiencias de Zinc”

RECOMENDACIONES DE USO. Fertilizante líquido de aplicación vía foliar

CULTIVO	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Vides (de mesa, pisquera y vinífera)	0,5 - 1	Aplicaciones para promover crecimiento de brotes: desde 20-30 cm. de brotes a pre-flor (3 a 4 aplicaciones). Aplicaciones de pre-flor a inicio de flor en variedades con semilla (2 aplicaciones), cada 7 días. En uva de mesa desde bayas cuajadas hasta ablande, 3 aplicaciones cada 15 a 20 días.
Cerezos y Guindos	0,5 - 1	Aplicar en inicio de flor, repetir 7 días después (2 aplicaciones). Aplicar desde post cuaje hasta quiebre de color para promover crecimiento de brotes, 3 aplicaciones cada 10 a 15 días.
Almendros	1 - 1,5	Aplicar en inicio de flor; repetir 7 días después (2 aplicaciones).
Carozos (Duraznos, Nectarines, Ciruelos, Damascos y Plumcots)	0,5 - 1	Aplicar en inicio de flor, repetir 7 días después (2 aplicaciones). Aplicar desde post cuaje hasta quiebre de color para promover crecimiento de brotes, 3 aplicaciones cada 10 a 15 días
Pomáceas (Manzanos, Perales y Membrillos)	0,5 - 1	Aplicar en inicio de flor, repetir 7 días después (2 aplicaciones). Aplicar desde fruto cuajado cada 20 días para promover el crecimiento de brotes, 3 aplicaciones.
Granados	1 - 1,5	Aplicar en inicio de flor, repetir 7 días después (2 aplicaciones).
Avellanos Europeos	1 - 1,5	Aplicar desde octubre a diciembre cada 20 a 25 días (3 aplicaciones).
Kiwi	0,5 - 1	Aplicaciones para promover crecimiento de brotes: desde 20-30 cm. de brotes a pre-flor (3 aplicaciones). Aplicaciones de pre-flor a inicio de flor (2 aplicaciones), cada 7 días.
Nogales	1 - 2	Aplicar desde octubre a diciembre cada 20 a 25 días (3 aplicaciones).
Cítricos (Naranjos, Limoneros, Mandarinos, Clementinos, Pomelo y Tangelo)	1 - 1,5	Aplicar en cada "flush" de crecimiento de brotes de primavera y otoño (3 a 4 aplicaciones).
Paltos	1 - 1,5	Aplicar en panícula expuesta, 1 aplicación.
Olivos	1 - 1,5	Aplicaciones para promover crecimiento de brotes: octubre, noviembre y diciembre (3 aplicaciones).
Fruittas	0,5	Aplicar desde inicio y hasta fin de flor, cada 7 a 10 días (4 a 5 aplicaciones).
Berries (Frambuesos, Arándanos, Moras, Zarzaparrillas y Cranberries)	0,5 - 1	Aplicar en inicio y plena flor, cada 7 a 10 días (2 aplicaciones).
Papas	1 - 1,5	Aplicar desde inicio de tuberización, repitiendo a los 15 días (2 aplicaciones).
Maíz	1	Aplicar en aparición de la panoja (1 aplicación).
Trigo, Avena, Cebada y Triticale	1	Aplicar en inicio de macolla (1 aplicación).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hora. Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura (inferiores a 30°C) y viento, temprano en la mañana o al atardecer. No aplicar si existe riesgo de lluvia inminente. Condiciones de almacenamiento: almacenar en lugar fresco y seco, evitando luz solar directa sobre el producto.

COMPATIBILIDAD: POLY Zn es compatible con otros fertilizantes foliares salvo aquellos cuyo pH sea superior a 9 (Óxidos, Carbonatos e Hidróxidos principalmente). Compatible con fertilizantes y productos fitosanitarios de uso habitual en frutales, hortalizas y cultivos. POLY Zn no debe mezclarse con productos cúpricos de alta concentración en base a hidróxido de cobre, oxiclورو de cobre, óxido cuproso, caldo bordelés y sulfato de cobre en polvo.