

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

POLARIS® 40 WP, insecticida, cuyo ingrediente activo Metidati n pertenece al grupo qu mico de los organofosfatos. Se debe evitar su inhalaci n, ingest n, contacto con la piel, ojos y la contaminaci n de los alimentos. Durante la preparaci n del concentrado s lido usar delantal impermeable, m scara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. Durante la aplicaci n usar como protecci n, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek , protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del l quido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Despu s de la aplicaci n ba arse con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<< **DEBE DAR AVISO A LOS APICULTORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL  REA DE APLICACI N Y ZONA DE INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA APLICACI N** >>
<< **APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MA ANA O AL ATARDECER** >>

POLARIS® 40 WP, es extremadamente t xico para peces. Ligeramente t xico para microcrust ceos acu ticos y **MODERADAMENTE T XICO PARA ABEJAS**. Muy t xico para aves.

<< **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NI OS Y DE PERSONAS INEXPERTAS** >>
<< **LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES** >>
<< **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA** >>
<< **NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO** >>
<< **LA ELIMINACI N DE RESIDUOS DEBER  EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE** >>

Ant doto: Sulfato de Atropina y Toxogonin (OBIDOXIMAS). Las obidoximas son m s efectivas durante las primeras 36 horas. **Tratamiento m dico de emergencia:** Realizar tratamiento sintom tico.

S ntomas de intoxicaci n: Se puede observar dolor far ngeo y abdominal, salivaci n, n useas, v mitos, diarrea.

Primeros auxilios: En caso de contacto cut neo: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, u as y pliegues cut neos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto ocular:** lavar los ojos con abundante agua corriente y fr a, por al menos 15 minutos, cuidando que los p rpados permanezcan abiertos. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos despu s de los primeros 5 minutos y luego contin e con el enjuague. **En caso de inhalaci n:** trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo. Si la persona no respira otorgar respiraci n artificial. **En caso de ingest n:** no inducir el v mito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar al afectado al centro hospitalario m s cercano.

<< **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD** >>

Tel fonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACI N RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL** >>

Conserve **POLARIS® 40 WP** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garant a expresa o impl cita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicaci n est  fuera de su control, en un medio biol gico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de informaci n complementaria. El fabricante s lo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicaci n como as  mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

  **Marca registrada de AGR COLA NACIONAL S.A.C. E I.**

POLARIS® 40 WP

INSECTICIDA

POLVO MOJABLE (WP)

Autorizaci n del Servicio Agr colo y Ganadero N  1.718

POLARIS® 40 WP, es un insecticida no sist mico que act a por ingest n o contacto, recomendado para el control de los insectos detallados en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICI�N:	
* Metidati�n	40 % p/p (400 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100 % p/p (1 kg)
* Fosforoditioato de S-2,3-dihidro-5-metoxi-2-oxo-1,3,4- tiadiazol-3-ilmetilo y de O,O-dimetilo	

<< **LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO** >>

Lote N :
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia

SANTIAGO – CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA – CHILE

INSTRUCCIONES DE USO

POLARIS® 40 WP, es un insecticida no sist mico que act a por contacto e ingest n, recomendado para el control de los insectos detallados en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/100 L	OBSERVACIONES	CARENCIA (d�as)
Manzana, Pera, Membrillo	Escama de San Jos�, Polilla de la manzana, Gusano de los penachos, Pulg�n del manzano, Ps�lido del peral	80 - 100	Usar la dosis mayor sobre Escama de San Jos�, pr�ximo o durante el periodo de migraci�n de ninfas (noviembre y enero). La dosis menor se recomienda en enero para Escama de San Jos�. En el resto de las plagas, aplicar al aparecer el problema o seg�n monitoreo. Para el control de Escama de San Jos�, aplicar tambi�n a salidas de inviemo y/o poscosecha. Cubrimiento sugerido 2000 L/ha	Manzana: 10 Pera: 14 Membrillo: 45
Damasco, Ciruelo, Almendro, Cerezo, Duraznero, Nectarino	Escama de San Jos�, Polilla oriental de la fruta, Pulg�n verde del duraznero, Pulg�n negro del duraznero, Trips californiano, Burrito, Chape del cerezo	100	En duraznero y nectarino aplicar 70 gr/Hl. Para el control de Escama de San Jos�, aplicar durante el per�odo de migraci�n de ninfas. En las otras plagas, aplicar de acuerdo a monitoreo. Para el control de polillas seg�n lo indiquen las trampas de feromona. Cubrimientos sugerido 1500 L/ha	Cerezo, almendro: 21 Durazno, nectarino, ciruelo: 28 Damasco: 40
Olivo, N�spero	Conchuela negra, Escama blanca, Chanchitos blancos (<i>Pseudococcus longispinus</i>), Trips (<i>H. haemorrhoidalis</i>)	100	Para control de Conchuela negra del olivo, aplicar desde diciembre a febrero. Para el resto de las plagas, aplicar al aparecer el problema de acuerdo a monitoreo. Cubrimiento sugerido 2000 L/ha.	Olivo: 60 N�spero: 45
Ajo, Cebolla	Pulg�n (<i>M. Persicae</i>), Langostino (<i>E. Curveola</i>), Trips (<i>T. Tabaci</i>), Polilla del tomate, Polilla de la papa, Cuncunilla de las hortalizas, Cuncunilla verde, Polilla del fr�jol, alfalfa, Pilme de la papa	0,8 – 1,2 kg/ha.	Aplicar al observar los insectos en movimiento con abundante mojamiento 200-500 L/ha. Se puede repetir el tratamiento con reinfestaci�n, considerando los per�odos de carencia para cada especie.	Ajo,cebolla: 14
Vides	Conchuela caf� europea, Conchuela grande caf�, Eulia, Trips (<i>D. Reuten</i>)	100	Aplicar en primavera, al aparecer los primeros insectos o ninfas m�viles. Cubrimientos sugerido 1500 L/ha	35

Instrucciones de Uso:
- En olivo y membrillo aplicar un solo una vez por temporada. Para el resto de los cultivos, aplicar como m ximo 3 veces por temporada con un intervalo m nimo de 25 d as.
- Evitar su uso en especies y variedades susceptibles, por ejemplo, Nectarines Armking.
-Se debe evitar la deriva de la aplicaci n: no aplicar con viento mayor a 8 km/hr.
-Para una mejor acci n se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la ma ana o al atardecer, evitando el secado muy r pido de la pulverizaci n.
-Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje.
-No aplicar durante las horas de m s calor (sobre 30  C).
-No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.

Preparaci n de la mezcla: Llenar el estanque de la pulverizadora con agua hasta   partes, luego agregar **POLARIS® 40 WP** con agitaci n constante hasta completar el volumen total. Es preciso que el equipo aplicador cuente con agitador mec nico.

Compatibilidad: **POLARIS® 40 WP**, es compatible con productos fitosanitarios de uso corriente, de acci n neutra.

Incompatibilidad: **POLARIS® 40 WP**, es incompatible con productos fitosanitarios de reacci n alcalina que contengan cal o sulfuro de cal, o a base de cobre. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad f sica y de selectividad al cultivo.

Fitotoxicidad: **POLARIS® 40 WP**, no es fitot xico si es utilizado en las dosis y usos recomendados.

Tiempo de reingreso: 24 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protecci n. No corresponde reingreso de animales, ya que los cultivos en los que se recomiendan no tienen como objetivo la alimentaci n animal.

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

NOCIVO