

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

POLARIS® 40 WP, insecticida, cuyo ingrediente activo Metidatión pertenece al grupo químico de los organofosfatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación bañarse con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<< DEBE DAR AVISO A LOS APICULTORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA APLICACIÓN >>

<< APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MAÑANA O AL ATARDECER >>

POLARIS® 40 WP, es extremadamente tóxico para peces. Ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos y **MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS**. Muy tóxico para aves.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: Sulfato de Atropina y Toxogonin (OBIDOXIMAS). Las obidoximas son más efectivas durante las primeras 36 horas. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación: Se puede observar dolor faríngeo y abdominal, salivación, náuseas, vómitos, diarrea.

Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto ocular:** lavar los ojos con abundante agua corriente y fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** no inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar al afectado al centro hospitalario más cercano.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **POLARIS® 40 WP** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® **Marca registrada de AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. E I.**

POLARIS® 40 WP

INSECTICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.718

POLARIS® 40 WP, es un insecticida no sistémico que actúa por ingestión o contacto, recomendado para el control de los insectos detallados en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

* **Metidatión** 40 % p/p (400 g/kg)
Coformulantes c.s.p 100 % p/p (1 kg)

* Fosforoditioato de S-2,3-dihidro-5-metoxi-2-oxo-1,3,4- tiadiazol-3-ilmetilo y de O,O-dimetilo

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Distribuido por:


ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

INSTRUCCIONES DE USO

POLARIS® 40 WP, es un insecticida no sistémico que actúa por contacto e ingestión, recomendado para el control de los insectos detallados en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/100 L	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Manzana, Pera, Membrillo	Escama de San José, Polilla de la manzana, Gusano de los penachos, Pulgón del manzano, Psílido del peral	80 - 100	Usar la dosis mayor sobre Escama de San José, próximo o durante el periodo de migración de ninfas (noviembre y enero). La dosis menor se recomienda en enero para Escama de San José. En el resto de las plagas, aplicar al aparecer el problema o según monitoreo. Para el control de Escama de San José, aplicar también a salidas de invierno y/o poscosecha. Cubrimiento sugerido 2000 L/ha	Manzana: 10 Pera: 14 Membrillo: 45
Damasco, Ciruelo, Almendro, Cerezo, Duraznero, Nectarino	Escama de San José, Polilla oriental de la fruta, Pulgón verde del duraznero, Pulgón negro del duraznero, Trips californiano, Burrito, Chape del cerezo	100	En duraznero y nectarino aplicar 70 gr/Hl. Para el control de Escama de San José, aplicar durante el período de migración de ninfas. En las otras plagas, aplicar de acuerdo a monitoreo. Para el control de polillas según lo indiquen las trampas de feromona. Cubrimientos sugerido 1500 L/ha	Cerezo, almendro: 21 Durazno, nectarino, ciruelo: 28 Damasco: 40
Olivo, Nispero	Conchuela negra, Escama blanca, Chanchitos blancos (<i>Pseudococcus longispinus</i>), Trips (<i>H. haemorrhoidalis</i>)	100	Para control de Conchuela negra del olivo, aplicar desde diciembre a febrero. Para el resto de las plagas, aplicar al aparecer el problema de acuerdo a monitoreo. Cubrimiento sugerido 2000 L/ha.	Olivo: 60 Nispero: 45
Ajo, Cebolla	Pulgón (<i>M. Persicae</i>), Langostino (<i>E. Curveola</i>), Trips (<i>T. Tabaci</i>), Polilla del tomate, Polilla de la papa, Cuncunilla de las hortalizas, Cuncunilla verde, Polilla del fréjol, alfalfa, Pilme de la papa	0,8 – 1,2 kg/ha.	Aplicar al observar los insectos en movimiento con abundante mojamiento 200-500 L/ha. Se puede repetir el tratamiento con reinfestación, considerando los períodos de carencia para cada especie.	Ajo, cebolla: 14
Vides	Conchuela café europea, Conchuela grande café, Eulia, Trips (<i>D. Reuteri</i>)	100	Aplicar en primavera, al aparecer los primeros insectos o ninfas móviles. Cubrimientos sugerido 1500 L/ha	35

Instrucciones de Uso:

- En olivo y membrillo aplicar un solo una vez por temporada. Para el resto de los cultivos, aplicar como máximo 3 veces por temporada con un intervalo mínimo de 25 días.

- Evitar su uso en especies y variedades susceptibles, por ejemplo, Nectarines Armking.

-Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hr.

-Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.

-Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje.

-No aplicar durante las horas de más calor (sobre 30 °C).

-No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque de la pulverizadora con agua hasta ¾ partes, luego agregar **POLARIS® 40 WP** con agitación constante hasta completar el volumen total. Es preciso que el equipo aplicador cuente con agitador mecánico.

Compatibilidad: **POLARIS® 40 WP**, es compatible con productos fitosanitarios de uso corriente, de acción neutra.

Incompatibilidad: **POLARIS® 40 WP**, es incompatible con productos fitosanitarios de reacción alcalina que contengan cal o sulfuro de cal, o a base de cobre. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Fitotoxicidad: **POLARIS® 40 WP**, no es fitotóxico si es utilizado en las dosis y usos recomendados.

Tiempo de reingreso: 24 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección. No corresponde reingreso de animales, ya que los cultivos en los que se recomiendan no tienen como objetivo la alimentación animal.



NOCIVO

