

KELPURA®

Número de Lote:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:

Bioestimulante No Microbiano.

Composición:

Extracto de <i>Ecklonia maxima</i>	39,00% m/v
Ácido Algínico	0,25% m/v
Manitol	0,05% m/v
Materia Seca	1,50% m/m

Contaminantes:

Cadmio: 1.5 ppm Mercurio: 1.0 ppm Arsénico: 8.0 ppm
Cromo (VI): 2.0 ppm Plomo: 5.0 ppm Níquel: 5.0 ppm
Salmonella spp: Ausente *Escherichia coli*: Ausente

Parámetros Físicoquímicos:

Bioestimulante líquido en solución
Densidad: 1,02 g/ml a 20°C. pH (al 10% a 20 °C): 4.2

País de Origen: Sudáfrica.

Importador.

Agri Technovation Chile SPA,
Dirección: Cerro El Plomo 5420,
Oficina 1903, Piso 19 Las Condes,
Santiago, Chile

Fabricante.

Agri Technovation (Pty) Ltd.
Dirección: PO Box 5435 Meyersdal,
Sudáfrica.

Contenido: 1 litros



CARACTERÍSTICAS

KELPURA® es un extracto líquido de *Ecklonia maxima* altamente concentrado producido mediante un proceso exclusivo, a temperatura ambiente para retener los compuestos naturales de las algas, que asisten el desarrollo foliar y radicular del cultivo. Apto para uso en combinación con otros nutrientes y fitosanitarios. Para obtener resultados óptimos, **KELPURA®** debe utilizarse en combinación programa de fertilizantes.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Dosis	Observaciones
Uva de mesa	300 cc/100 L	Crecimiento de brotes: desde brotes 5-10 cm hasta inicio de floración 3-5 aplicaciones.
Vides viníferas y pisqueras	300 cc/100 L	En preflores, flor y cuaja.
Cerezos	300 cc/100 L	20% y 50% de flor. Crecimiento vegetativo: caída de pétalos, caída de chaquetas y luego aplicaciones semanales hasta color pajizo.
Almendros, nectarinos, durazneros, ciruelos, damascos, plumcot	300 cc/100 L	20% y 50% de flor. Crecimiento vegetativo: caída de pétalos, caída de chaquetas y una semana antes de endurecimiento de carozo.
Kiwis	300 cc/100 L	Crecimiento vegetativo inicial: brotes 10- 15; 40-50 y 60-80 cm. Inicio pétalos abiertos, frutos cuajados y 25-35 DDPP.
Paltos	300 cc/100 L	Aplicación en inicio de brote vegetativo en panícula.
Mandarinos, naranjos, limoneros, pomelo, tangelos	300 cc/100 L	Aplicación en 50 - 60 % de floración y en frutos cuajados.
Arándanos, frambuesas, frutillas, moras, cranberry, zarzaparrilla	300 cc/100 L	Aplicación desde 50% de floración y luego a intervalos semanales hasta mediados de cosecha.
Nogales	300 cc/100 L	En flor pistilada, repetir 7 días después. 3 aplicaciones desde frutos cuajados hasta endurecimiento del endocarpo.
Olivos	300 cc/100 L	Crecimiento de brotes: Con brote nuevo de 8 - 10 cm, repetir a los 15 días.
Avellano europeo	300 cc/100 L	Aplicar mediados de octubre, mediados de noviembre e inicios de diciembre.
Tomates, pimientos, ají, berenjenas, pepino dulce	3 L/ha	Crecimiento vegetativo post trasplante: 3 - 4 aplicaciones en floración y 3- 4 aplicaciones de inicio de cuaja en adelante.
Repollo, coliflor, brócoli, repollito de bruselas, rabanito	3 L/ha	Crecimiento vegetativo post trasplante: 3-5 aplicaciones con intervalos de 7-15 días.
Cebollas, ajos, puerros, chalota, ciboulette, bunching	3 L/ha	Aplicar en estado de 3-4 hojas; 6-7 hojas; 9-10 hojas e inicio de formación de bulbo.
Melones, sandías, pepinos, zapallito italiano, zapallo guarda	3 L/ha	Inicio de brotación lateral, 7 días después, inicio de flor, inicio de crecimiento de frutos, 7 y 14 días después.
Arvejas, habas, poroto verde y granado, porotos, garbanzos y lentejas	3 L/ha	Inicio de floración e inicio de crecimiento de vainas.
Trigo panadero, trigo candeal, avena, cebada, triticale	3 L/ha	Aplicar en "estado de bota".
Maíz	3 L/ha	Aplicar en estado V3 y en estado V6
Raps	3 L/ha	Inicio de floración.
Papas	3 L/ha	Inicio de tuberización y con tubérculos de 10-15 mm.
Lupino	3 L/ha	Estado de botón - inicio de flor.
Inmersión de plantas de trasplante	2.5 L/100L	Inmersión junto a fitosanitario.

Forma de aplicación: **KELPURA®** es un extracto de algas formulado para aplicaciones de alto y bajo volumen. Evite las aplicaciones en condiciones extremas, como temperaturas superiores a 30 °C, velocidades del viento superiores a 15 km/h o cuando las plantas se encuentran en estado de marchitez. Para mejorar la absorción, rocíe temprano en la mañana o en la noche, evite rociar durante el calor del día. Lleve ropa protectora adecuada cuando se pulverice con otros productos. No aplicar a través de filtros de menos de 100 micras.

• Suelo: Para aplicación al suelo, use de 5 a 7 L de concentrado por hectárea. Aplicar a través del sistema de riego o directamente. No diluir más de 500 partes de agua por 1 parte de **KELPURA®**.

• Foliar: Apto para usar con todos los sistemas de aplicación foliar. Para mejores resultados, aplique cuando las plantas tengan suficiente área foliar. Para obtener resultados óptimos, asegúrese de que el pH de la mezcla en el tanque sea entre 5-6. Agite bien antes de usar. Siempre mezcle **KELPURA®** con suficiente cantidad de agua. Nunca aplique **KELPURA®** sin diluir. Siga los procedimientos estándares de mezcla de tanques. No almacene producto mezclado.

Incompatibilidades y fitotoxicidad: **KELPURA®** es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes foliares, sin embargo, no aplique **KELPURA®** en una mezcla con herbicidas de amina. En combinación con fungicidas que contienen cobre, sulfatos, fosfatos o fosfonatos. Dentro de los 14 días antes o después de una aplicación de cobre. En combinación con fuentes de agua altamente alcalina y/o materiales con fuentes de agua o productos que contengan calcio, magnesio, carbonatos y/o fosfatos. El usuario asume toda la responsabilidad para garantizar la compatibilidad cuando se mezcla en tanque con otros productos. Se recomienda, realizar test de calidad del agua para garantizar una compatibilidad total y un óptimo rendimiento del producto. Condiciones de almacenamiento: No almacenar a la luz directa del sol. Almacenar el producto al interior a temperatura ambiente.