








Avena

		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1° A 2° NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente		PODIO								
		Manchado de grano									TYRONE X-TRA	
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	Rango Full + AJAX + Esteron Ten Ten									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	Rango Full (1) + AQUILES + GLIFOSATO									
		Malezas, gramíneas y hoja ancha		BINOMIO	Partidor							
		Malezas de hoja ancha				MCPA + AJAX + ZOOM TWIN (2) + Pirel (3)						
INSECTICIDAS		Insectos que atacan a la semilla y prevención de insectos (larvas y adultos) que afectan a la germinación y emergencia		punto								
		Insectos del follaje							ORBITA			
REGULADORES DE CRECIMIENTO		Tendadura							BelcoCel			
BIENESTAR VEGETAL										Armador		
		Fertilización Foliar Balanceada						MARTELLO	+		AminoMAX	
								Poly-Zn			Poly-B + Poly-Mg	KELPURA

(1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.

(2) Con presencia de sanguinaria, portillo, duraznillo y tréboles.

(3) Con presencia de manzanillón y crepis.