







# Cebada

		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1º Y 2º NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente		<b>Impulso</b> <b>PODIO</b>								
		Enfermedades del follaje Helminthosporiosis Rincosporiosis Otras						<b>TYRONE 250EC</b> <b>TYRONE X-TRA</b>				
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	<b>Rango Full</b> + <b>AdAX</b> + Esteron Ten Ten									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	<b>Rango Full</b> (1) + <b>AQUILES</b> +									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas			<b>BINOMIO</b> (4) <b>Theron Max</b> (4)		<b>ovASSION</b> + <b>ZUCOM</b>					
	Malezas de hoja ancha					<b>MCPA</b> + <b>AdAX</b> + <b>ZUCOM</b> <b>TVIN</b> (2) + Pirel (3)						
	Malezas gramíneas					<b>Partidor</b>						
INSECTICIDAS		Insectos que atacan a la semilla y prevención de insectos (larvas y adultos) que afectan a la germinación y emergencia		<b>punto</b> <small>ECO-FIT</small>								
		Insectos del follaje Pulgones y Cuncunillas						<b>ORBITA</b>  <b>punto</b> <b>HURRICANE</b>				
REGULADORES DEL CRECIMIENTO		Tendadura y promotor de rendimiento							<b>Armador</b>			
BIENESTAR VEGETAL		Fertilización foliar balanceada					<b>AminoMAX</b>		<b>MARTELLO</b>			
						<b>Poly-Zn</b>					<b>Poly-B</b> <b>KELPURA</b>	

(1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.

(2) Con presencia de sanguinaria, porotillo, duraznillo y tréboles.

(3) Con presencia de manzanillón y crepis.

(4) Extensión de etiqueta en trámite SAG.