

Tomate



| | PROBLEMA | ALMÁCIGO-SPEEDLING | PRE-TRASPLANTE | ESTABLECIMIENTO | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | FRUTO CERCANO A COSECHA | COSECHA | |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| FUMIGANTES DE SUELO | Hongos de suelo, Nematodos y Malezas | | Nemasol Basamid | | | | | | |
| FUNGICIDAS | Fusariosis | TRICHOFORTE <small>(inmersión de bandeja)</small> | | | TRICHOFORTE <small>(aplicación vía riego localizada)</small> | | | | |
| | Botritis y Alternariosis | | | | Shelter | ProBlad | | | |
| | Caida de plántulas | Metalaxil MZ | | | | | | | |
| | Tizón tardío | | | | MOXAN | Metalaxil MZ | RANMAN | | |
| | Botritis | | | | | Frontal | Altivo | Botector | |
| | Cancro bacteriano, Mancha bacteriana, Peca bacteriana | | | | BACIFORTE <small>(Peca bacteriana)</small> | Strepto Plus | Kocide 2000 | | |
| | Oidio | | | | SISTHANE | APOLLO | KREXIM | OPMINIO | CANDADO |
| | Alternariosis y Fulvia | | | | | OPMINIO | Tatio | | |
| HERBICIDAS | Malezas anuales | | SPECTRO (I) Bectra | Bectra | | | | | |
| | Malezas de hoja angosta | | | AQUILES + HERBICIDAS | | | | | |
| | Malezas anuales hoja ancha y angosta y Chufa | | Partidor | | | | | | |
| INSECTICIDAS | Araña bimaquilada, Ácaro del bronceado, Minahojas | | | | FASTplus + UltraSpray | | | | |
| | Pulgones | | | ORBITA | HURRICANE | LADIADOR | puntO | | |
| | Póvilta del tomate | | | LADIADOR | FASTplus + UltraSpray | ZERO | Belenus | CoStar | |
| | Mosquita blanca | | | LADIADOR | DELCO | APPLAUD 40 SC | HURRICANE | APPLAUD 40 SC | |
| | Gusanos cortadores y del fruto | | | | ZERO | Belenus | | | |
| | Trips | | | ORBITA | LADIADOR | | | | |
| | Minadores foliares | | | | NEMESIS | | | | |
| | Regular madurez | | | | | | Ethilen | Poly-K · Poly-Mg | |
| BIENESTAR VEGETAL Y BIOPESTICIDAS | Estimular crecimiento radicular | | ferticote Agri | | | | | | |
| | Estimular crecimiento vegetativo, manejo o prevención de estrés | | | | MARTELLO | AminoMAX | | | |
| | Aumentar cuaja y mejorar rendimiento | | | | KELPURA | | | | |
| | Fertilizantes foliares | | | | FosFight | | | | |
| | Firmeza fruto y prevención de pudrición apical de frutos | | | | Poly-Ca | Poly-Mg | Poly-K | | |

(1) Un segundo tratamiento se puede efectuar entre las hileras del cultivo 60-90 días después.