



























Trigo

	PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1º Y 2º NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA	
FUNGICIDAS	 Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente. Prevención de mal del pie y otras enfermedades											
	 Septoria, Royas y Oídio											
HERBICIDAS	 Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas											
	 Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	 (1)										
	 Malezas de hoja ancha y gramíneas											
	 Malezas de hoja ancha											
INSECTICIDAS	 Insectos que atacan la semilla, germinación y emergencia											
	 Insectos del follaje											
	 Tendadura											
OTROS Y/O REGULADORES												
BIENESTAR VEGETAL	 Fertilización foliar balanceada											
												

- (1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.
- (2) Con presencia de sanguinaria, porotillo, duraznillo y tréboles.
- (3) Con presencia de manzanillo y crepis.