

HERBICIDA

# BENGALA 200 WP

POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3550

**BENGALA 200 WP**, es un herbicida sistémico, selectivo, que actúa como regulador del crecimiento de tipo auxínico, recomendado para el control de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

## COMPOSICIÓN:

Dicamba (*) .....	14,4% p/p (144 g/Kg)
Nicosulfuron (**) .....	5,25 % p/p (52,5 g/Kg)
Coformulantes c.s.p .....	100% p/p (1 Kg)

\* ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico

\*\*1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilcarbamoil-2-piridilsulfonil)urea

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Importado y Distribuido por:



**ANASAC CHILE S.A**

Almirante Pastene 300 - Providencia  
SANTIAGO - CHILE

Fabricado por:

**ANASAC CHILE S.A.**

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA- CHILE

**Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County,

Zhejiang, China

ZIP N° 324400

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Dicamba**, pertenece al grupo químico del ácido benzoico. **Nicosulfuron**, pertenece al grupo químico de las sulfonilureas.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la preparación del polvo mojable usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma.

Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma.

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.

Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**BENGALA 200 WP**, es moderadamente tóxico para microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para peces y aves. Ligeramente tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel:** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. **En caso de contacto**

**con los ojos:** lavar los ojos con abundante agua corriente y fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar

con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Si se presenta

falla respiratoria, aplique respiración artificial. **En caso de ingestión:** Lave con agua la boca para remover restos del producto, dar a beber 2 tazas de agua y NO PROVOCAR EL VÓMITO.

En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

**Síntomas de Intoxicación:** Irritación sistema gastrointestinal. Náuseas, vómitos y diarrea. Debilidad muscular y agotamiento.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **BENGALA 200 WP**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

## CUIDADO



## INSTRUCCIONES DE USO

**BENGALA 200 WP** es un herbicida sistémico, selectivo y post-emergente para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha anuales y perennes mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso en cultivos de maíz de grano y/o silo.

### Cuadro de instrucciones de uso

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Maíz	Yuyo ( <i>Brassica rapa</i> ) Hualcacho ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Malvilla ( <i>Anoda cristata</i> ) Rábano ( <i>Raphanus raphanistrum</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Papilla ( <i>Pitiraea cuneato-ovata</i> ) Correhuela ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Hierba del té ( <i>Bidens aurea</i> ) Maicillo ( <i>Sorghum halepense</i> )	0,9 – 1,1	Aplicar de post-emergencia del maíz, al estado de 4-7 hojas. Sobre malezas en sus primeros estados de desarrollo (2 a 4 hojas) y en crecimiento activo. Volumen de aplicación con equipo convencional terrestre: mínimo 200 L agua/ha.

### Observaciones:

- Usar dosis menor para control de malezas anuales (yuyo, hualcacho, malvilla, rábano y verdolaga) y dosis mayor para control de malezas perennes (papilla, correhuela, hierba del té y maicillo)
- Utilizar boquillas específicas para aplicación de herbicidas.
- Se recomienda utilizar surfactante Winspray Miscible o Zoom 50.
- Aplicar 1 vez por temporada.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.
- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 28°C.

### Preparación de la mezcla:

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **BENGALA 200 WP**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante.

### Compatibilidad:

**BENGALA 200 WP** es compatible con la mayoría de los herbicidas, insecticidas y fungicidas de uso común.

En todos los casos se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad.

### Incompatibilidad:

**BENGALA 200 WP** es incompatible con productos organofosforados o aquellos de reacción alcalina. Productos fosforados al follaje del cultivo deben separarse una semana de la aplicación de **BENGALA 200 WP**.

### Fitotoxicidad:

**BENGALA 200 WP** no es fitotóxico para el maíz, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta. Consultar con empresas productoras de semillas de maíz por la susceptibilidad varietal al herbicida. No aplicar en cultivo distintos al maíz. No aplicar en maíz dulce ni maíz choclero.

### Tiempo de reingreso:

12 horas para ingresar al área tratada para personas y animales.

**Clasificación HRAC:** Nicosulfuron grupo B2 inhibición de la acetolactato sintetasa (ALS); Dicamba grupo O actúa como regulador de crecimiento similar a ácido indolacético (AIA)

### Carencias:

No corresponde ya que la aplicación va dirigida al suelo para el control de las malezas, en los primeros estados de desarrollo del cultivo.

## CUIDADO

