

Precauciones y advertencias

COBAMIN PLUS® no es corrosivo y puede ser aplicado con equipos convencionales y de bajo volumen.

Utilizar vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del producto. Evite el contacto con ojos y piel.

No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación.

Almacenar en lugar fresco y seco, evitando luz solar directa sobre el producto. Agitar antes de usar.

El producto es estable a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

Recomendaciones de uso

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Perales	1 - 1,5	Aplicar en botón blanco y 50% de flor (2 aplicaciones)
Vides (de mesa, pisquera y vinífera)	1 - 1,5	Aplicar en precosecha con un máximo de 3 aplicaciones por temporada
Nogales	2 - 3	Aplicar en inicio de brotación, elongación de amentos, floración y desde fruto cuajado en adelante, máximo 4 aplicaciones por temporada
Cítricos (naranja, limonero, mandarino, clementino, pomelo y tangelo)	1 - 1,5	Aplicar hasta plena flor y en precosecha durante los meses de mayo, junio y julio, máximo 4 aplicaciones por temporada
Papa	1 - 1,5	Aplicar desde inicio de tuberización, máximo 2 aplicaciones por temporada
Tomate, ají, pimentón, pepino dulce y berenjena	0,75 - 1,5	Aplicar durante el período vegetativo y desde cuaja del primer racimo cada 7 días a 10 días (4 aplicaciones por temporada)
Berries (frambuesa, arándano, mora, zarzaparrilla y cranberrie)	1 - 1,5	Aplicar desde botón floral hasta precosecha, máximo 4 aplicaciones por temporada
Kiwi	1 - 1,5	Aplicar desde brotación a inicio de floración cada 15 días, máximo 4 aplicaciones por temporada
Carozos (almendros, cerezos, guindos, duraznos, nectarines, damascos y plumcots)	1 - 1,5	Aplicar desde botón rosado cada 7-10 días, máximo 4 aplicaciones por temporada
Avellano europeo	1 - 1,5	Aplicar en brotación, caída de hojas y durante el período de receso invernal e inicio desarrollo de fruto, máximo 4 aplicaciones por temporada
Ajos y cebollas	0,75 - 1,5	Aplicar en inicio de bulbificación
Arveja, poroto verde y poroto granado	1 - 1,5	Aplicar previo botón floral y hasta plena flor
Olivos	1,5 - 2	Aplicar entre floración y precosecha



Cobamin^{Plus}

Formulado Soluble en base a Cobre y Zinc

Contenido neto

1 L

N° de lote

Fecha de elaboración

Fecha de vencimiento

Fabricado y distribuido por

Anasac Chile S.A.
Almirante Pastene 300
Providencia, Santiago de Chile
www.anasac.cl



Composición

RIQUEZAS GARANTIZADAS	%p/p	%p/v
COBRE (Cu) Sulfato de cobre pentahidratado	4,85	6,2
ZINC (Zn) Sulfato de zinc heptahidratado	4,7%	6,1

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Apariencia	Líquido cristalino de color azulino
Solubilidad en agua	100% a 20°C
Densidad	1,17 - 1,43 g/ml a 20°C
pH (al 1%)	2,8 - 4,8 a 20°C

METALES PESADOS

Arsénico	< 10 mg/kg
Plomo	< 1 mg/kg
Cadmio	< 10 mg/kg
Mercurio	< 1 mg/kg

Características

COBAMIN PLUS® es un producto formulado como líquido soluble para aplicaciones foliares, en base a cobre y zinc, que previene y corrige deficiencias de estos elementos.

Compatibilidad

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

Es compatible con una serie de fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares.

Consultar con el equipo técnico de ANASAC CHILE S.A mayores antecedentes de compatibilidad específica con fitosanitarios.