

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Ciazofamida pertenece al grupo químico Cianoimidazoles. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. **Durante la preparación:** usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. **Durante la aplicación:** usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial, traje protector adecuado (Ej.: overol impermeable) que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la neblina generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con abundante agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo. **Riesgos ambientales: RANMAN 400 SC** es considerado no peligroso para abejas, es prácticamente no tóxico a aves. Es tóxico a organismos acuáticos y peces.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones de Triple Lavado:

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total.

Paso 2: Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar.

Paso 3: Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado.

Síntomas de Intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, lavar los ojos con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Consultar al médico.

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Consultar al médico.

Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Llamar al médico inmediatamente. **Inhalación:** Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Antídoto: No existe antídoto específico.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Teléfonos de emergencia: RITA_CHILE: 22777 1994, ANASAC 22470 6888

Ranman® es una marca registrada de Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

RANMAN® 400 SC

FUNGICIDA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Fungicida, eficaz para el control preventivo del ataque de hongos fitopatógenos como se indica en el cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICION

Ciazofamida* 40% p/v (400 g/L)
Coformulantes c.s.p 100% p/v (1L)

*4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamida

**Autorización Servicio Agrícola y Ganadero
N° 2.486**

N° de Lote:

Fecha de Fabricación (mes y año):

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto:

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO
ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Fabricado por:

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15, Edobori 1-Chomc, Nishi-ku, Osaka
Japón

Importado y Distribuido por:

 **anasac**

ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

PHYTEUROP

Rue Pierre My – Z.I. Grande Champagne
49260 Montreuil Bellay
Francia

IBC Manufacturing Company
416 East Brooks Road, Memphis, Tennessee, 38109
Estado Unidos



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

RANMAN 400 SC, es un fungicida de contacto y con acción preventiva, con actividad contra los hongos fitopatógenos indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso para Aplicaciones Terrestres

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	OBSERVACIONES
Papas, Tomates	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> A 1)	200	Aplicar preventivamente o según presión de la enfermedad en el caso de haber sido detectada. Para obtener una excelente protección, se recomienda repetir según condiciones de infección (7 a 10 días). Utilizar un volumen de agua, que garantice una buena distribución de Ranman 400 SC en el follaje (utilizar como mínimo 200 L agua/ha). Número máximo de aplicaciones: 6.
Lechuga	Mildió o bremia (<i>Bremia lactucae</i>)	150 a 250	Realizar la aplicación dirigida al follaje con un mojamiento de 300 a 500 L/ha. Aplicar preventivamente o según presión de la enfermedad en el caso de haber sido detectada. Máximo 4 aplicaciones cada 15 días.
Espinaca	Mildió (<i>Peronospora farinosa spinaciae</i>)	150 a 250	Realizar la aplicación dirigida al follaje con un mojamiento de 300 a 500 L/ha. Aplicar preventivamente o según presión de la enfermedad en el caso de haber sido detectada. Máximo 4 aplicaciones cada 15 días.
Sandía	Mildió (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200	Realizar la aplicación dirigida al follaje con un mojamiento de 300 a 600 L/ha. Aplicar preventivamente o según presión de la enfermedad en el caso de haber sido detectada. Realizar un máximo de 5 aplicaciones con una frecuencia de 15 días.
Melón		200 a 250	
Cebolla	Mildió (<i>Peronospora destructor</i>)	200	Asperjar con un volumen de agua de 500 a 800 L de agua/ha. Emplear el volumen máximo de agua por hectárea cuando el cultivo presenta follaje adulto. Utilizar con una frecuencia de aplicación de 7 y 12 días. Usar mayor frecuencia de aplicación bajo presión alta del hongo y/o condición de clima favorable para el desarrollo de la enfermedad. Realizar en un máximo de tres aplicaciones durante todo el período vegetativo del cultivo de cebollas.
Zanahoria	Caída de plántulas "Dumping off" (<i>Pythium ultimum</i>)	450	El volumen de agua recomendado durante el período de germinación y emergencia es 1000 L de agua/ha. Con plantas emergidas y en pleno desarrollo, el volumen sugerido de agua para asperjar el fungicida es de 500 L/ha. Utilizar con una frecuencia de aplicación de 10 a 15 días. Usar mayor frecuencia de aplicación bajo presión alta del hongo y/o condición de clima favorable para el desarrollo de la enfermedad. Se debe utilizar en dos oportunidades durante el período de establecimiento, comenzando a los 15 días de la siembra. Posteriormente, durante el desarrollo siguiente del cultivo se puede usar hasta un máximo de tres ocasiones.

Cuadro de Instrucciones de Uso para Aplicaciones Aéreas

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Papas, Tomates	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i> A 1)	200 mL/ha	Aplicar preventivamente o según presión de la enfermedad en el caso de haber sido detectada. Para obtener una excelente protección, se recomienda repetir según condiciones de infección (7 a 10 días). Mojamiento: 40 L/ha. Número máximo de aplicaciones: 6.

Las dosis mayores deben ser aplicadas cuando existen condiciones ambientales favorables para la proliferación de los hongos y/o cuando existe una alta presión de infestación de la plaga.

Preparación de la mezcla: Adicionar agua al estanque hasta la mitad, adicionar la cantidad requerida de **RANMAN 400 SC** y completar hasta volumen total con agitación permanente.

Incompatibilidad: El producto no tiene incompatibilidades conocidas.

Compatibilidad: Se recomienda mezclar con un adyuvante organosiliconado para lograr un mejor cubrimiento. Para mezclas específicas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Fitotoxicidad: **RANMAN 400 SC** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Período de Carencia: Papas: 7 días. Tomates y cebollas: 3 días. Lechuga y espinaca: 10 días. Sandía y melón: 6 días. Zanahoria: 21 días. En cultivos de exportación, atenderse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso al Área Tratada (personas y animales): Se debe esperar un tiempo de resguardo de 12 horas. No se define un período de reingreso para animales porque el producto no está recomendado para ser aplicado en zonas de pastoreo o lugares donde estos transitan.

El producto no debe ser aplicado cuando existe pronóstico de lluvias, dominio de vientos fuertes, ocurrencia de heladas y/o estrés hídrico de las plantas.

Nota al comprador: mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distinto a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control.



CUIDADO

