

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

GRUPO QUÍMICO: Fungicida biológico en base a esporas de la Cepa C55 de la bacteria *Bacillus subtilis*. Seguir las precauciones habituales en el manejo de fitosanitarios. **Para su seguridad durante la preparación:** Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión e inhalación. Use guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, máscara con filtro y antiparras; aleje animales domésticos y personas extrañas. **Para su seguridad durante la aplicación:** Use guantes impermeables, botas de goma, overol, máscara con filtro y antiparras. Lávese después del trabajo y antes de comer, Cambiarse y lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No hay antecedentes de intoxicación asociados a *Bacillus subtilis*.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **1.- En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **2.- En caso de Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **3.- En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **4.- En caso de Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

ANTÍDOTO: No posee, tratar sintomáticamente.

TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA: Ante cualquier síntoma de molestia, acudir a un centro de salud y atención especializado

ECOTOXICIDAD: No es tóxico para aves, peces y abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS • EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD • REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMOS HUMANO O ANIMAL • NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA • NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO • LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: RITA: (56) 22 777 1994 BIOPACIFIC: (56) 22 526 5228

Precauciones de Almacenaje: El almacenamiento debe ser en un lugar fresco, seco y la sombra; separado de semillas, forrajes y fertilizantes; siempre conservando el producto en su envase original, bien cerrado hasta 2 años desde la fecha de envasado. No debe exponerse al sol ni a las altas temperaturas.

Instrucciones para el Triple Lavado: Vacíe el envase en el estanque pulverizador y mantengalo en posición de descarga 30 segundos; a continuación agregue agua hasta un cuarto (1/4) de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos; vierta el agua del envase en el equipo pulverizador y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Repita el proceso 3 veces. Finalmente perforo el envase para evitar su reutilización.

BACIFORTE

BACTERICIDA BIOLÓGICO SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.956-O

BACIFORTE® es un bactericida biológico preventivo en base a una cepa nativa de *Bacillus subtilis*. **BACIFORTE®** coloniza rápidamente los nichos ecológicos y microheridas en la planta compitiendo con las bacterias fitopatógenas. Además, contiene metabolitos secundarios con acción biocontroladora, que inhiben el desarrollo de las enfermedades en las plantas.

COMPOSICIÓN

Bacillus subtilis cepa C55* 0,1% p/v (1 g/L)
Coformulantes c.s.p 100% p/v (1 L)

*Contiene 1×10^9 UFC/ml

**<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO
ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>**

Lote N°:

Contenido Neto: 1L

Fecha fabricación: Ver información en el envase.

DISTRIBUIDO POR:



ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300
Providencia
Santiago, Chile
www.anasac.cl

FABRICADO POR:



BioPacific SPA
Santa Elvira 030, Ñuñoa,
Santiago, Chile
Teléfono +56 2 2526 5228
www.biopacific.cl

NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO "AUTORIZADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA NACIONAL"

Baciforte® es un biocontrolador preventivo, recomendado contra enfermedades provocadas por *Pseudomonas syringae*

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Tomate	Peca bacteriana <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	300-500 ml/100 L de agua	Aplice preventivamente realizando un mojamiento completo de la planta, desde trasplante a floración cada 7 días y a continuación de cualquier labor que genere heridas (desbrote, amarre, despunte, etc). Aplicar la dosis máxima si observa focos de la enfermedad. Se recomienda un mojamiento de 300-1200 litros según estado fenológico o labores que generen heridas en el cultivo.
Cerezo, Damascos, Durazneros, Nectarinos, Plumcot.	Cáncer bacterial <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	100-150 cc/hL	Realizar hasta 4 aplicaciones por temporada. 3 aplicaciones en caída de hojas y 1 aplicación en inicio de floración, con mojamiento de 1000 a 1500 L/Ha. Utilizar la dosis mayor, ante una alta presión de la enfermedad.

Mojamiento asegurando un buen cubrimiento.

Aplicación: Previo a la aplicación, diluir el producto con agua en un recipiente agitando vigorosamente hasta alcanzar un líquido homogéneo e incorporar en el estanque del equipo de aplicación. Realizar la aplicación de preferencia temprano en la mañana o al atardecer.

Incompatibilidad: Incompatible con plaguicidas en base a bactericidas. Baciforte® presenta una alta compatibilidad con la mayoría de los productos agrícolas del mercado. No obstante, CONSULTAR AL DISTRIBUIDOR antes de llevar a cabo una aplicación conjunta con otros productos.

Fitotoxicidad: no presenta fitotoxicidad en el cultivo recomendado.

Período de carencia (días): No tiene carencia

Tiempo de reingreso al área tratada: Para personas es posible reingresar cuando el producto se ha secado. Para animales no corresponde, ya que los cultivos no son de consumo animal.



CUIDADO

