	Trigo											
		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1º Y 2º NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente. Prevención de mal del pie y otras enfermedades		Impulso PODIO								
		Septoria. Royas y Oídio							TYRONE TYRONE X-TRA			
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	Rango Full + AJAX Esteron Ten Ten									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	RangoFull [1] + AQUILES									
	的如此。	Malazas da baja anaba			BINOMIO		»»Partidor.					
		Malezas de hoja ancha y gramíneas			THE	RON Max.						
		Malezas de hoja ancha						MCPA + Aday + z@m TVVIN (2) Pirel (3)				
		Malezas gramíneas						HUMBA · ZOM				
INSECTICIDAS	BAN	Insectos que atacan la semilla, germinación y emergencia		punte								
	4 375	Insectos del follaje							ORBITA			
OTROS Y/O REGULADORES		Tendedura							Belo	ocel Armador		
	Mark Strain Strain						Amino MAX		Pøl	y - B		
BIENESTAR	Will and the state of the state	Fertilización foliar balanceada						P ly-Zn	MARTE	LO + Amin		PURA

⁽¹⁾ Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días. (2) Con presencia de sanguinaria, porotillo, duraznillo y tréboles. (3) Con presencia de manzanillón y crepis.

Información de carácter referencial