


Avena

												
		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1º A 2º NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente										
		Manchado de grano										
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas										
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato										
		Malezas, gramíneas y hoja ancha										
		Malezas de hoja ancha										
INSECTICIDAS		Insectos que atacan a la semilla y prevención de insectos (larvas y adultos) que afectan a la germinación y emergencia										
		Insectos del follaje										
REGULADORES DE CRECIMIENTO		Tendedura										
BIENESTAR VEGETAL		Fertilización Foliar Balanceada							+ 			
												

(1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.

(2) Con presencia de sanguinaria, portillo, duraznillo y tréboles.

(3) Con presencia de manzanillón y crepis.