

# Soluciones Anasac

# Frutillas



**anasac**





































































[www.anasac.cl](http://www.anasac.cl)   

# SOLUCIONES ANASAC FRUTILLAS

	PROBLEMAS	PRE-SIEMBRA PRE-TRASPLANTE	BARBECHO QUÍMICO	PRE-EMERGENCIA	POST EMERGENCIA	DESARROLLO VEGETATIVO	FLORACIÓN	CUAJADO Y FRUCTIFICACIÓN
FUMIGANTES	Nemátodos, insectos, hongos de suelo y malezas anuales de semilla	Nemasol® Basamid®						
HERBICIDAS	Malezas anuales y perennes		RangoFull					
	Malezas de hoja ancha			SPECTRO				
	Malezas de hoja angosta				AQUILES			
INSECTICIDAS	Pulgón y gusano de la frutilla				Diazinon ORBITA ZERO			
	Arañitas				FAST			
	Drosophila suzukii							ZERO STONG «GRANDEVO»
	Cuncunillas				Sevin			
	Trips					STONG		FAST
FUNGICIDAS	Botritis				AgroCopper (Preventivo)	Frontal. Alivio. Bonnus. Shelter. Botector.		
	Oídio				Impulso DOMINIO	Azufre Floable AN		
	Pudrición del cuello o de la corona				Defense Metalaxil	Metalaxil MZ		
	Cáncer bacteriano					Strepto plus		
BIENESTAR VEGETAL	Estimulación radicular	Release						
	Estimulación, cuaja y floración					KELPURA®		
	Prevención y manejo de estrés. Crecimiento vegetativo y potenciar calibre					MARTELLO®		
	Fertilización foliar				FosFight AminoMAX+ Poly-B. Poly-Zn.			
	Firmeza de fruto							Poly-Ca Poly-Mg Poly-K
	Mejorar riego e infiltración	WaterAid.						

La información aquí entregada es de carácter referencial. La información oficial está contenida en la etiqueta de cada producto.



SOLUCIONES ANASAC					
FRUTILLAS					
Convencionales					
ACARICIDAS					
Producto	Composición	Problema	Dosis	Link	
	Abamectina	Araña bimaculada, Araña roja europea, Trips, Falsa araña roja de la vid, Eriófido de la mora	0,5 - 1,2 L/ha		
BACTERICIDAS					
Producto	Composición	Problema	Dosis	Link	
Strepto Plus WP	Sesquisulfato de estreptomicina, Clorhidrato de oxitetraciclina	Cáncer bacteriano	60 g/hl (preventivo) 120 g/hl (curativo)		
FUMIGANTES					
Producto	Composición	Problema	Dosis	Link	
	Dazomet 98% p/p	Nemátodos, hongos de suelo, insectos de suelo y malezas anuales y perennes de semilla	Suelos livianos: 35 - 40 g/m² Suelos pesados o alta materia orgánica: 60 g/m²		
	Metam-sodio	Nemátodos, hongos e insectos	750 - 1200 L/ha		
FUNGICIDAS					
Producto	Composición	Problema	Dosis	Link	
	Sulfato de cobre pentahidratado	Botritis	100 g/hl de agua		
	Fenhexamida	Botritis	100 cc/hl		
Azufre Floable AN	Azufre	Eriófido del tomate y Oídio	200 - 300 cc/hl de agua		
	Pirimetanilo	Botritis	2 L/ha		
	Fosetil-aluminio	Pudrición radical y de la corona, Pudrición del cuello	350 - 500 g/hl	Inmersión de raíces en una suspensión. Aplicar al momento de plantar	
			10-20 g/m²	Riego por goteo, inyectado al sistema de riego en el tercio final	
			250 - 350 g/hl	Utilizar buen cubrimiento 1000/ha, máximo 3 a 4 veces por temporada con follaje activo	
	Difenoconazol	Oídio y acción complementaria contra Botritis	Preventivo: 12 - 20 cc/hl (mín. 120 - 200 cc/ha) Curativo: 20 cc/hl (mín. 200 cc/ha)		
	Fenhexamida, Fludioxonilo	Botritis y Moho negro	200 cc/hl (mín. 1 L/ha)		
	Azoxistrobina	Antracnosis, Botritis y Oídio	75 - 100 cc/hl (mín. 0,75 - 1 L/ha)		
MetalaxilMz	Metalaxilo, Mancozeb	Esclerotiniosis, Mildiú, Pudrición de la corona, Pudrición púrpura y Septoriosis	250 g/hl		
Metalaxil 25 DP	Metalaxilo 25%	Pudrición de cuello y corona	20 - 40 g/100 m lineales		
	Ciprodinilo, Fludioxonilo	Botritis y Antracnosis	80 - 120 g/hl (mín. 0,8 - 1,2 kg/ha)		
HERBICIDAS					
Producto	Composición	Problema	Dosis	Link	
	Cletodim	Malezas anuales y perennes de hojas angosta	Según Maleza		
	Glifosato sal potásica	Malezas anuales y perennes	Según Maleza		
	Glifosato sal isopropilamina	Malezas anuales y perennes	Según maleza		
	Glifosato sal monoamónica	Malezas anuales y perennes	Según maleza		
	Pendimetalin	Malezas anuales	4 - 5 L/ha		
INSECTICIDAS					
Producto	Composición	Problema	Dosis	Link	
Diazinon 40 WP	Diazinon	Langostino de la frambuesa, Cabrito de la frambuesa, Pulgón de la frutilla, Trips de las flores, Gusano de la frutilla, Conchuela café europea, Enrollador del naranjo, Chanchitos blancos	100 - 140 g/hl		
	Tiametoxam, Lambda-cihalotrina	Gusano cortador, Pulgón de la frutilla, Gusano de los penachos y Langostino de la frambuesa	150 - 200 cc/ha		
	Carbarilo	Cuncunillas: Cortadora de la acelga, del tabaco, Subterránea, Cortadora de la papa, Cogollera del maíz, Granulosa de las hortalizas, Áspera y de las espigas, Polilla del tomate, Pilme y Langostino de la remolacha	2,6 - 3,5 L/ha		
	Espinosad	<i>Drosophila suzukii</i> y Trips de California	<i>Drosophila suzukii</i> : 200 ml/ha Trips: 7 - 12 L/ha		
	Lambda-cihalotrina	Gusano de los penachos, Langostino de la frambuesa, Trips de las flores, Pulgón negro de la alfalfa, Pulgón de la frutilla, Minador de las chacras, Gorgojo de la frutilla, Cabrito, Cuncunillas. <i>Drosophila suzukii</i>	150 - 250 cc/ha - 15 -25 cc/hl <i>Drosophila suzukii</i> : 250 cc/ha		
Biorracionales					
BIOESTIMULANTES					
Producto	Composición	Acción	Dosis	Link	
	<i>Ecklonia maxima</i> 39,0 % p/v	Estimulación, cuaja y floración	3 L/ha Cuaja desde inicio de floración con 20% de flor en intervalos semanales hasta frutos de 5 mm. Crecimiento de frutos desde fruto recién cuajado en intervalos semanales hasta inicio de cosecha.		
	<i>Ascophyllum nodosum</i> 36,0 % p/v	Estimular crecimiento vegetativo. Antiestrés por factores abióticos agua, temperatura y radiación	1 - 2 L/ha		
	Algas pardas y Ácido fúlvico	Estimulación y desarrollo radicular	10 - 15 L/ha		
BIOFUNGICIDAS					
Producto	Composición	Problema	Dosis	Link	
	<i>Aureobasidium pullulans</i> Cepas DSM 14940 y DSM 14941	Botritis	70 - 100 g/hl		
BIOINSECTICIDAS					
Producto	Composición	Problema	Dosis	Link	
	<i>Chromobacterium subtsugae</i> cepa PRAA4-1T	<i>Drosophila suzukii</i>	3,0 kg/ha		
Bienestar Vegetal					
ACONDICIONADOR DE SUELO					
Producto	Composición	Acción	Dosis	Link	
	Co-polímeros de polietileno y polipropilén-glycoles	Mejorar riego	1,0 - 3,5 L/ha		
FERTILIZANTES					
Producto	Composición	Acción	Dosis	Link	
	Aminoácidos	Estimular crecimiento	200 - 300 cc/hl		
	Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio y microelementos de liberación controlada.	Estimular crecimiento vegetativo y radicular	200 - 500 kg/ha		
	Fosfito de potasio	Fertilizante foliar	2 - 4 L/ha		
	Boro al 15% p/v	Mejorar cuaja y desarrollo de frutos	0,5 - 1,0 L/ha		
	Calcio al 22% p/v	Aumentar firmeza de frutos y previene pudrición apical de frutos	2,0 - 3,0 L/ha		
	Potasio al 38% p/v	Regular madurez, firmeza de fruto y prevención de pudrición apical de frutos	3,0 - 5,0 L/ha		
	Magnesio al 14% p/v	Regular madurez, firmeza de fruto y prevención de pudrición apical de frutos	2,0 - 3,0 L/ha		
	Zinc al 15% p/v	Desarrollo de brotes	0,5 L/ha		
La información aquí entregada es de carácter referencial. La información oficial está contenida en la etiqueta de cada producto.					