

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

CONSUL® 65 WP, fungicida, cuyo ingrediente activo Dodina pertenece al grupo químico de las guanidinas.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la preparación del polvo mojable usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior.

Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior.

No aplicar con velocidad de viento mayor a 5 m/seg y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Después de la aplicación bañarse con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<< PARA APPLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Información Ecotoxicológica: **CONSUL® 65 WP**, es muy tóxico para peces, moderadamente tóxico para aves y **LIGERAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS**.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Síntomas de Intoxicación: Se puede observar irritación gastrointestinal y diarrea. Puede provocar eritema y leve edema.

Primeros auxilios:

En caso de contacto cutáneo: Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua corriente y fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos.

En caso de inhalación: Traslade al afectado al aire. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.

En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **CONSUL® 65 WP** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustituye de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. E.I.

CONSUL® 65 WP

FUNGICIDA - BACTERICIDA

POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2.607

CONSUL® 65 WP, fungicida-bactericida de acción preventiva, curativa y con efecto retroactivo, recomendado especialmente para el control de Sarna o Venturia del Manzano y Peral. Además, controla Cloca en Durazneros y Nectarinos, Repilo en Olivo y otras enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Dodina (*) 65% p/p (650 g/kg)
Coformulantes c.s.p. 100% (1 kg)

* Acetato de 1-dodecilguanidina

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Lote Nº :

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Distribuido por:




ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

CONSUL® 65 WP, fungicida-bactericida de acción preventiva, curativa y con efecto retroactivo, recomendado especialmente para el control de Sarna o Venturia del Manzano y Peral. Además, controla Cloca en Durazneros y Nectarinos, Repilo en Olivo y otras enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS g/100 L	OBSERVACIONES	CARENZA (días)
MANZANO PERAL	Venturia o Sarna del Manzano	90	Tratamientos preventivos: Aplicar desde puntas verdes hasta botón rosado. Repetir en este período cada siete días.	7
	Aplicaciones posteriores a botón rosado: 60		Volumen de agua sugerido: 1800 – 2300 L/ha. Según estado fenológico y tamaño de los árboles	
	Venturia o Sarna del Peral	90	Tratamiento curativo : Aplicar después de una lluvia.	
DURAZNERO NECTARINO	Cloca Corineo Monilia	100	Aplicar a inicio de caída de las hojas en Otoño y al comienzo a hinchar las yemas (Agosto), hasta el estado de botón rosado. En ambas épocas se puede repetir 10 días después. Volumen de agua sugerido: 800-1500 L/ha según estado fenológico y tamaño de los árboles	11
CEREZO	Cáncer bacterial <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	100-200	Iniciar aplicaciones cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir con intervalos de 7 a 10 días. Efectuar como máximo 3 aplicaciones en la temporada, alternando con fungicidas de distinto modo de acción. Volumen de agua sugerido: 800-1500 L/ha según estado fenológico y tamaño de los árboles	11
KIWI	Tizón bacteriano <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	200-300	Iniciar aplicaciones cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir con intervalos de 7 a 10 días. Efectuar como máximo 3 aplicaciones en la temporada, alternando con fungicidas de distinto modo de acción. Volumen de agua sugerido: 1000 L/ha	11
OLIVO	Repilo	100	Aplicar en otoño, después de la cosecha hasta pre flor, de modo de que la aplicación se realice sin fruta presente. Volumen de agua sugerido: 1500-2000 L/ha	244

Cuadro de Instrucciones de uso para aplicación aérea:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carenza (días)
OLIVO	Repilo	1,8 Kg/ha	Aplicar en otoño, después de la cosecha hasta pre flor, de modo de que la aplicación se realice sin fruta presente. Volumen de agua sugerido: 20 a 60 L/ha	244

-Para olivo realizar un máximo de 1 aplicación por temporada, para el resto de los cultivos realizar como máximo 3 aplicaciones por temporada.

-Usar dosis menor con baja presión de la enfermedad y dosis mayor con presiones medias a altas.

-Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hr.

-Para una mejor acción del producto se recomienda aplicar en horas de menor temperatura (menor a 28°C) y viento temprano en la mañana o al atardecer. No aplicar durante las horas de más calor (sobre 30°C).

-Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje, y no aplicar si existe riesgo de lluvias inminentes.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque de la pulverizadora con agua hasta ¾ partes, luego agregar **CONSUL® 65 WP** con agitación constante hasta completar el volumen total. Es preciso que el equipo aplicador cuente con agitador mecánico.

Compatibilidad: **CONSUL® 65 WP**, es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común.

En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: **Consul® 65 WP** es incompatible con surfactantes aniónicos, azufre, aceites, emulsiones, cloro benilatos y productos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: **CONSUL® 65 WP**, no es fitotóxico si es utilizado en las dosis y usos recomendados. En pomáceas no aplicar con baja temperatura ambiente (menor a 7°C). No mezclar con azufre en perales variedad Deyenne de Comice. Se ha observado algo de fitotoxicidad en manzanos de variedad Golden Delicious.

Tiempo de reingreso: 4 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección. No corresponde reingreso de animales ya que los cultivos en los que se recomiendan no tienen como objetivo la alimentación animal.

