

Pomáceas, carozos y nogales



Regiones Monitoreadas

Valparaíso | Región Metropolitana | O'Higgins | Maule

¿Es momento de aplicar Delico® y Admiral®?



AÚN NO APLICAR - La plaga permanece en diapausa invernal

90,3%

NINFA 1ER ESTADO

*Estadio invernante "gorrita negra",
sin salir de diapausa*

7C IRAC

PIRIPROXIFENO

*Modulador de la hormona juvenil;
interrumpe la muda*

6 h

PERÍODO LIBRE DE PRECIPITACIÓN

*Alta lipofilia (Kow 5,37 Log P):
resistente al lavado*

➤ ¿Qué está pasando hoy?

El ingrediente activo de Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC actúa como un modulador del receptor de la hormona juvenil y que al ser aplicado en estados activos premetamórficos (juveniles, gorrita negra), interrumpe el proceso de muda.

- 90,3% de la población corresponde a Ninfas I.
- Predomina el estado invernante (gorrita negra).
- No se observa una salida masiva de la diapausa.
- El comportamiento observado coincide con el histórico de la especie.

➤ Ventajas de Delico® y Admiral®

- Resistentes al lavado por lluvia.
- Período libre de precipitaciones: 6 horas.
- Reguladores del crecimiento (Piriproxifeno grupo 7C de la clasificación IRAC).




➤ ¿Qué recomendamos hoy?


- Continuar monitoreando el desarrollo de la plaga.
- Esperar el próximo boletín de actualización.
- Preparar la estrategia de aplicación para el momento oportuno.

Desarrollo de la plaga

Proporción de estados de desarrollo de escama de San José al día 23 de julio de 2026, por región.



Proporción de estados de desarrollo de escama de San José al día 23 de julio de 2026, por cultivo.



Conclusión

A la fecha, aún no es el momento oportuno para iniciar la aplicación de Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC. El posicionamiento se actualizará semanalmente conforme avance el desarrollo de la plaga.