

Pomáceas, carozos y nogales



Regiones Monitoreadas

Valparaíso | Región Metropolitana | O'Higgins | Maule

¿Es momento de aplicar Delico® y Admiral®?



SÍ APLICAR - aún estás a tiempo de iniciar la aplicación.

68,4%

NINFA 1ER ESTADO

*Estado predominante;
salida de diapausa invernal*

24,6%

NINFA 2DO ESTADO

*Estado en aumento;
actividad biológica creciente*

6 h

PERÍODO LIBRE DE PRECIPITACIÓN

*Alta lipofilia (log Kow 5,37):
resistente al lavado*

➤ ¿Qué está pasando hoy?

El ingrediente activo de Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC, piriproxifeno, actúa como modulador del receptor de la hormona juvenil. Aplicado en estados activos premetamórficos (juveniles, incluida la 'gorrita negra'), interrumpe el proceso de muda.

- **Estado predominante:** el 68,4 % de la población corresponde a ninfas de primer estado.
- **Cambio observado:** las ninfas de segundo estado ya representan el 24,6 %, señal de que la plaga continúa saliendo de la diapausa invernal.
- **Lectura para el manejo:** la evolución coincide con el comportamiento histórico y respalda el inicio de las aplicaciones de Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC.




➤ ¿Qué recomendamos hoy?


- Iniciar las aplicaciones según la estrategia definida.
- Asegurar una buena cobertura durante la aplicación.
- Respetar un período de 6 horas sin precipitaciones.

Desarrollo de la plaga

Proporción de estados de desarrollo de escama de San José los días 23 y 30 de julio y 4 y 10 de agosto de 2026, por región.



Proporción de estados de desarrollo de escama de San José los días 23 y 30 de julio y 4 y 10 de agosto de 2026, por cultivo.



Conclusión

De acuerdo con la biología de la especie y los resultados de las prospecciones, es el momento oportuno para iniciar la aplicación de **Admiral® 10 EC** y **Delico® 100 EC**.