

Pomáceas, carozos y nogales



Regiones Monitoreadas

Valparaíso | Región Metropolitana | O'Higgins | Maule

¿Es momento de aplicar Delico® y Admiral®?



SÍ APLICAR - Inicio del momento oportuno de control

73%

NINFA 1ER ESTADO

*Estadio invernante "gorrita negra",
sin salir de diapausa*

19%

NINFA 2DO ESTADO

Salida de diapausa invernante

6 h

PERÍODO LIBRE DE PRECIPITACIÓN

*Alta lipofilia (Kow 5,37 Log P):
resistente al lavado*

➤ ¿Qué está pasando hoy?

El ingrediente activo de Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC actúa como un modulador del receptor de la hormona juvenil y que al ser aplicado en estados activos premetamórficos (juveniles, gorrita negra), interrumpe el proceso de muda.

- **Estado predominante:** el 73 % de la población corresponde a ninfas de primer estado, principalmente en el estadio invernante de "gorrita negra".
- **Cambio observado:** el 19 % corresponde a ninfas de segundo estado, señal de que la plaga comenzó a salir de la diapausa invernante.
- **Lectura para el manejo:** la evolución coincide con el comportamiento histórico de la especie y respalda el inicio de las aplicaciones en este momento.




➤ ¿Qué recomendamos hoy?


- Iniciar aplicaciones según estrategia definida.
- Asegurar buena cobertura en la aplicación.
- Considerar condiciones climáticas.

Desarrollo de la plaga

Proporción de estados de desarrollo de escama de San José los días 23 y 30 de julio y 4 de agosto de 2026, por región.



Proporción de estados de desarrollo de escama de San José los días 23 y 30 de julio y 4 de agosto de 2026, por cultivo.



Conclusión

En atención a la biología de la especie y los resultados obtenidos por medio de las prospecciones, es el momento oportuno para iniciar la aplicación Admiral® 10 EC y Delico® 100 EC.